

# 微分方程式 第9回レポート課題と解答

出題日: 2015/11/30(月)

担当教員: 江夏 洋一 (A205 教室, 16:20-17:50)

1. 次の行列の積を計算せよ.

[(1)-(5) 各5点]

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (3) \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(4) \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad (5) \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & 5 & -6 \\ 7 & -8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

解答. (1)  $2 \times 2$  型行列と  $2 \times 2$  型行列の積は  $2 \times 2$  型行列であり,

$$\begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot (-1) + (-5) \cdot 1 & 2 \cdot (-4) + (-5) \cdot (-3) \\ 3 \cdot (-1) + (-1) \cdot 1 & 3 \cdot (-4) + (-1) \cdot (-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & 7 \\ -4 & -9 \end{pmatrix}. \quad \dots \text{(答)}$$

(2)  $2 \times 2$  型行列と  $2 \times 1$  型行列の積は  $2 \times 1$  型行列であり,

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + (-2) \cdot (-1) \\ -4 \cdot 2 + 5 \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -13 \end{pmatrix}. \quad \dots \text{(答)}$$

(3)  $3 \times 1$  型行列と  $1 \times 3$  型行列の積は  $3 \times 3$  型行列であり,

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 0 & 1 \cdot 2 & 1 \cdot 1 \\ -2 \cdot 0 & -2 \cdot 2 & -2 \cdot 1 \\ 3 \cdot 0 & 3 \cdot 2 & 3 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \\ 0 & 6 & 3 \end{pmatrix}. \quad \dots \text{(答)}$$

(4)  $2 \times 2$  型行列と  $2 \times 2$  型行列の積は  $2 \times 2$  型行列であり,

$$\begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \cdot 1 + 1 \cdot 3 & -3 \cdot 2 + 1 \cdot 4 \\ 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 3 & 2 \cdot 2 + (-1) \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}. \quad \dots \text{(答)}$$

(5)  $3 \times 3$  型行列と  $3 \times 1$  型行列の積は  $3 \times 1$  型行列であり,

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & 5 & -6 \\ 7 & -8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 3 + (-2) \cdot 1 + 3 \cdot (-1) \\ -4 \cdot 3 + 5 \cdot 1 + (-6) \cdot (-1) \\ 7 \cdot 3 + (-8) \cdot 1 + 9 \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}. \quad \dots \text{(答)}$$

2.  $A = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$  とする. このとき,  $AB$  および  $BA$  を求めよ.

[20点]

解答.  $3 \times 3$  型行列と  $3 \times 3$  型行列の積は  $3 \times 3$  型行列である ( $AB$  と  $BA$  が等しくないことにも注意しよう).

$$AB = \dots = \begin{pmatrix} -9 & 16 & 21 \\ -6 & 10 & 12 \\ -3 & 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad BA = \dots = \begin{pmatrix} -9 & -8 & -7 \\ 12 & 10 & 8 \\ 9 & 6 & 3 \end{pmatrix}. \quad \dots \text{(答)}$$

3. 次の行列  $A$  が正則であるかを述べよ. また,  $A$  が正則ならば  $A$  の逆行列  $A^{-1}$  を求めよ.

[(1)-(3) 各5点]

$$(1) A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -5 & -1 \end{pmatrix} \quad (2) A = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -124 & 165 \end{pmatrix} \quad (3) A = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -6 & 8 \end{pmatrix}$$

解答. (1)  $\det A = 2 \cdot (-1) - (-5) \cdot 3 = 13 \neq 0$  より,  $A$  は正則である. したがって,  $A$  の逆行列  $A^{-1}$  が存在し,

$$A^{-1} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}, \quad \text{あるいは}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{13} & -\frac{3}{13} \\ \frac{5}{13} & \frac{2}{13} \end{pmatrix}. \quad \dots \text{(答)}$$

(2)  $\det A = 3 \cdot 165 - (-124) \cdot (-4) = -1 \neq 0$  より,  $A$  は正則である. したがって,  $A$  の逆行列  $A^{-1}$  が存在し,

$$A^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 165 & 4 \\ 124 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -165 & -4 \\ -124 & -3 \end{pmatrix}. \quad \dots \text{(答)}$$

(3)  $\det A = 3 \cdot 8 - (-6) \cdot (-4) = 0$  より,  $A$  は正則でない. したがって,  $A$  の逆行列  $A^{-1}$  は存在しない.

...

4. 次の行列の固有値  $\lambda \in \mathbf{C}$  および各固有値に属する固有ベクトルを求めよ.

[(1)-(2) 各 20 点]

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \qquad (2) \begin{pmatrix} 8 & -1 \\ -1 & 8 \end{pmatrix}$$

解答. (1)  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$  とおき,  $A$  の固有値  $\lambda$  および各固有値  $\lambda$  に属する固有ベクトルを以下の手順により求めよう.

**Step 1.** 固有値  $\lambda$  の導出:  $\lambda I - A = \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ -3 & \lambda - 2 \end{pmatrix}$  より,

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - 1)(\lambda - 2) - (-3)(-2) = \lambda^2 - 3\lambda + 2 - 6 = \lambda^2 - 3\lambda - 4 = (\lambda + 1)(\lambda - 4).$$

したがって, 行列  $A$  の固有値  $\lambda$  は  $\lambda = -1, 4$ .

**Step 2.** 各固有値  $\lambda$  に属する固有ベクトルの導出:

(i)  $\lambda = -1$  の場合  $\dots \lambda I - A = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -3 & -3 \end{pmatrix}$  より,

$$(\lambda I - A)\mathbf{u} = \mathbf{0} \iff \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -3 & -3 \end{pmatrix} \mathbf{u} = \mathbf{0}$$

$$\iff \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -3 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$

$$\iff \begin{cases} -2u_1 - 2u_2 = 0 \\ -3u_1 - 3u_2 = 0 \end{cases}$$

$$\iff -2u_1 - 2u_2 = 0. \qquad (*)$$

ここで,  $u_1 = c$  ( $c$  は任意定数) とおき,  $u_1 = c$  を (\*) 式に代入すると  $-2c - 2u_2 = 0$ , すなわち,  $u_2 = -c$ . したがって,

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} c \\ -c \end{pmatrix} = c \underline{\underline{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}}}, \quad c \in \mathbf{C}.$$

(ii)  $\lambda = 4$  の場合  $\dots \lambda I - A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$  より,

$$(\lambda I - A)\mathbf{u} = \mathbf{0} \iff \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{u} = \mathbf{0}$$

$$\iff \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$

$$\iff \begin{cases} 3u_1 - 2u_2 = 0 \\ -3u_1 + 2u_2 = 0 \end{cases}$$

$$\iff 3u_1 - 2u_2 = 0. \qquad (**)$$

ここで,  $u_1 = c$  ( $c$  は任意定数) とおき,  $u_1 = c$  を (\*\*) 式に代入すると  $3c - 2u_2 = 0$ , すなわち,  $u_2 = \frac{3}{2}c$ . したがって,

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} c \\ \frac{3}{2}c \end{pmatrix} = c \underline{\underline{\begin{pmatrix} 1 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}}}, \quad c \in \mathbf{C}.$$

(i), (ii) より,  $\lambda = -1$  に属する固有ベクトルは  $\underline{\underline{\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}}}$ ,  $\lambda = 4$  に属する固有ベクトルは  $\underline{\underline{\begin{pmatrix} 1 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}}}$ .  $\dots$  (答)

(2)  $A = \begin{pmatrix} 8 & -1 \\ -1 & 8 \end{pmatrix}$  とおき,  $A$  の固有値  $\lambda$  および各固有値  $\lambda$  に属する固有ベクトルを以下の手順により求めよう.

**Step 1.** 固有値  $\lambda$  の導出:  $\lambda I - A = \begin{pmatrix} \lambda - 8 & 1 \\ 1 & \lambda - 8 \end{pmatrix}$  より,  $\det(\lambda I - A) = (\lambda - 8)^2 - 1 = (\lambda - 7)(\lambda - 9)$  である.

したがって, 行列  $A$  の固有値  $\lambda$  は  $\lambda = 7, 9$ .

**Step 2.** 各固有値  $\lambda$  に属する固有ベクトルの導出: (1) と同様の方法によって,  $\lambda = 7$  に属する固有ベクトルは  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,

$\lambda = 9$  に属する固有ベクトルは  $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$  である. [(1) と同様に, 各自で途中式過程を補おう.]  $\dots$  (答)